

BULLETIN TECHNIQUE DE LA
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

AVEYRON. AUDE. GARD. HÉRAULT. LOZÈRE. PYRÉNÉES-ORIENTALES

MONTPELLIER - 16, Rue de la République - Tél. 72 58-72 - C. C. P. 52 38 57

17 Juin 1960

INFORMATIONS POMME DE TERRE n° 2Aveyron - Lozère
Zone V AMILDIOU

Les pluies des 6, 10 et 12 juin ont fait disparaître la protection qu'assuraient les traitements correspondants à notre note du 2 juin. De plus, la floraison est en cours ou imminente dans de très nombreuses cultures. En conséquence nous prescrivons l'exécution d'un nouveau traitement réalisé avant le 22 juin.

Utiliser : Bouillie bordelaise ou bourguignonne à 500 g de cuivre par hl.
Sulfate basique de cuivre }
Oxychlorure de cuivre } 500 g de cuivre par hl.
Oxyde cuivreux }

Zinèbe : 160 g de matière active par hectolitre
Association de Zinèbe et de cuivre : 60 g de zinèbe
: 150 g de cuivre

DORYPHORE

L'insecte est présent dans toutes les cultures négligées. Les traitements (obligatoires) peuvent être réalisés par bouillie mixte à l'occasion des traitements anti-mildiou. Le moment le plus favorable est l'époque où les larves atteignent la grosseur d'un grain de blé.

3ème Edition n° 7
5ème Edition n° 6

Aveyron - Lozère

TRAITEMENTS DE LA VIGNE

Le mildiou peut repartir à la suite des pluies récentes. Exécuter un traitement approprié en ajoutant une bouillie mixte pour prévenir les dégâts de "vers de la grappe".

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,

P. BERVILLE

Le Contrôleur chargé des
Avertissements agricoles,

L.L. TROUILLON

P 325